水獺和河狸超級比一比

河狸和水獺雖然都是哺乳動物，也同樣是游泳健將，事實上牠們卻一點親戚關係都沒有。

水獺是食肉目的捕魚高手。

剛出生的小水獺眼睛還沒張開，沒有牙齒，也沒有行動能力，約2個月大開始跟媽媽學游泳。

河狸是素食主義者，不斷增生的門齒
是啃食樹枝的最佳工具。

河狸也會將咬斷的樹枝拖到
水中堆疊築巢，經常堵住溪
流成為自家的護城河，因此
有築壩高手之稱。

河狸屬於囓齒目動物，
河狸寶寶屬於早熟型，
生下來眼睛就是張開
的，也能立刻下水游
泳。



水獺具有流線型的身體、既粗且長的尾巴、腳趾間有蹼，不論在陸上或水中的行動都很靈活，游泳的速度每小時約9.6 - 11公里。

水獺不完全是夜行性，白天也會活動與覓食，食物包括魚、蝦、蟹、蛙類等，除育幼期外通常單獨活動，會在土堤挖掘淺穴當作繁殖期的育幼場所。

河狸是夜行性動物，頭大、腿短、腳趾間有蹼、尾巴扁平。

河狸在水中可輕易游出每小時7公里的速度。

河狸在陸地上行動緩慢，雙腳站立啃樹或拖拉木頭時，尾巴就是支撐和平衡的工具。

歐亞水獺小檔案

- 分類：哺乳綱、食肉目、貂科、水獺屬。
- 保育等級： 瀕臨絕種保育類野生動物。
- 分布：原分布於臺灣全島沿海至海拔1,500公尺以下之溪流附近，臺灣本島早已無其蹤跡，目前僅金門地區有小族群紀錄。
- 形態：軀幹長60-80公分，尾長35-40公分，頭短而寬，與頸部不易分辨；口周圍具長腮鬚，軀體圓長；四肢短，每肢五趾，指間均有蹼膜；體披兩層毛，內層毛密度極高，目的是防水及增加保暖功能。歐亞水獺具有腺體，被認為和資源防禦及繁殖交配的訊息溝通有關。
- 棲地：屬半水棲肉食動物，水陸域環境必須同時具備，才能生存。白天或夜晚皆可見其活動，但以夜間為主，棲息於溪流、濕地、水塘等環境，擅長游泳、喜好潛游，動作迅速，領域範圍大。
- 食性：以魚、蝦、蛙類等水生生物為主食，經常在水質好、少污染、少干擾、食物豐富的水陸交界地帶出沒。
- 生殖：懷孕期約六、七十日，一胎通常生2-3隻幼獸。

加拿大河狸小檔案

- 分類：脊索動物門、哺乳綱、囓齒目、河狸科。
- 保育等級： 非保育類野生動物 。
- 形態：後腳有蹼，尾巴寬寬扁扁，幾乎沒有毛，但有鱗片覆蓋。肛門附近有一對腺體。牠們用姿態、氣味記號、尾巴拍打和叫聲來溝通。
- 分佈：北美、歐洲與亞洲少數地方。
- 河狸是半水生的動物，游泳和潛水能力都很好，喜歡生活在小河或池塘。
- 河狸通常成小群共同生活，由一對河狸和牠們所生的小孩組成，母狸是群中的優勢者。
- 河狸因為身上的厚皮毛及肛門腺體可以入藥，遭到獵捕；也因為人類建築水壩、開發水路、溼地或污染水源等遭受生存威脅。

水獺和河狸超級比一比，
臺北市立動物園分享辨識秘訣。

中文名稱	歐亞水獺	加拿大河狸
英文名稱	European Otter	American Beaver
學名	*Lutra lutra*	*Castor canadensis*
食性	魚、蝦、蟹、蛙類	植物
築巢地點	岸邊土堤	用樹枝築壩為巢
習性	獨居	小家庭
幼獸	晚熟性	早熟性
尾巴	圓條狀	扁平
陸地上活動速度	敏捷	緩慢
生物學分類	食肉目(Carnivora)	囓齒目(Rodentia)

下次遇見河狸或水獺時，如果在陸上和水中行動速度都跟演武俠片一樣的就是水獺，有著大頭和平板狀尾巴的是河狸，根據這些特性，你也可以很容易的分辨牠們。