

山羌

山羌是台灣最小的鹿科動物，分布於全台低海拔到海拔3000公尺山區，天然闊葉林或混生林。



山羌

身長不及一米，雄性有短角而雌性僅有骨質隆起，在鹿科動物中公山羌的角並不特化，且保
有其他鹿科動物所沒有的上犬齒，靠保護色及靈敏的行動來避敵，雄性額內緣至角基內側各
有一黑色條紋，雌性則在額前有盾型斑塊，白色的腹部以及尾巴下方的白色也是主要特徵，
叫聲似犬吠。

資料引自：維基百科



山羌的食物

山羌的食物偏好幼芽、嫩草、漿果，時常咬下葉片後卻留著葉柄。

影片→



猴子趕山羌

山羌有時會在猴子旁邊出現，坐享其成，但是會發生什麼事呢，你瞧！

資料引自：維基百科

影片→



山羌「合群」嗎

- 山羌多數獨居，其領域幾乎不會重疊，於一隻雄性的領域中可能會有三、四隻一齊的雌性。
- 資料引自：維基百科



山羌的社會互動行為

- 山羌的個性比較害羞，受干擾時會以跳躍方式迅速逃竄並且搖動尾巴，露出尾巴下的白毛來混淆干擾者的視線，有人戲稱他是舉白旗投降。

資料引自<https://teia.tw/zh-hant/natural-valley/species/12248>


影片→



山羌的領域行為

山羌的眼前額頭上有氣味腺，走路時會低頭將氣味抹在周遭，有時則會在樹幹刮磨樹皮再塗抹氣味，建立領域，這種標記的行為在雄羌身上較為明顯。

資料引自 <https://teia.tw/zh-hant/natural-valley/species/12248>



山羌的排遺

山羌的排遺約0.7公分深綠色單粒或數粒呈一小團，一頭較尖一頭較鈍的水滴狀、橄欖型、卵形…等形狀。

資料引自<https://teia.tw/zh-hant/natural-valley/species/12248>



山羌的繁殖

多數鹿科動物在鹿茸生長時，是不製造精子且無生殖能力的，但山羌卻不受此限制，雄羌約9 個月大性成熟後，睪丸內全年都有成熟的精子，雌羌約5 個月大就可以開始排卵，而且在生產後3、4天就能再度受孕，也不受哺乳期影響，這些優勢讓牠們全年都可以繁殖。 資料引自<https://teia.tw/zh-hant/natural-valley/species/12248>



不棄養動物

過去山羌廣泛分布於全台，然而，較低海拔的山區多數已經被開發，獵捕、棲地破壞、貓狗的放養及棄養... 人類活動造成山羌極大的生存壓力。 資料引自<https://teia.tw/zh-hant/natural-valley/species/12248>



牛、鹿分不清

所有的鹿科都只有雄性會長角。台灣野山羊（以前叫做長鬃山羊）頭上也有角，但鹿跟羊的角卻相差很多：鹿的角是實心的，每年都會掉落重新生長，而山羊的角是中空的，且不會脫落。另外，在分類上，山羊、綿羊...其實都是「牛科」的喔！

資料引自<https://teia.tw/zh-hant/natural-valley/species/12248>

